



PROSPECTO : INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

FEPARIL 10mg/50mg/g gel Escina / Salicilato de dietilamina

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o si persisten después de 5 días, debe consultar al médico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Contenido del prospecto:

1. Qué es FEPARIL 10mg/50mg/g gel y para qué se utiliza
2. Antes de usar FEPARIL 10mg/50mg/g gel
3. Cómo usar FEPARIL 10mg/50mg/g gel
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de FEPARIL 10mg/50mg/g gel
6. Información adicional

1. QUÉ ES FEPARIL 10mg/50mg/g gel Y PARA QUÉ SE UTILIZA

FEPARIL 10mg/50mg/g gel se utiliza para el alivio local sintomático de los trastornos venosos superficiales, como pesadez y tirantez de las piernas con varices.

Se utiliza también para el alivio local sintomático del dolor y de los hematomas superficiales producidos por golpes, contusiones, distensiones y esguinces leves como consecuencia de una torcedura.

2. ANTES DE USAR FEPARIL 10mg/50mg/g gel

No use FEPARIL 10mg/50mg/g gel:

Si tiene alergia o hipersensibilidad a la escina, al salicilato de dietilamina, al ácido acetilsalicílico, a otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINES), o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

En afecciones de la piel, tales como dermatitis, eczemas o urticarias.

Sobre mucosas, ni zonas de la piel irritadas, heridas o expuestas a radioterapia.

Tenga especial cuidado con FEPARIL 10mg/50mg/g gel:

Uso externo.

Usar solo sobre la piel intacta.

Evite el contacto con los ojos, el oído y la boca.

No aplicar simultáneamente en la misma zona que otros medicamentos de uso cutáneo.

CORREO ELECTRÓNICO

Sugerencias_ft@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID

No utilizar de forma prolongada sin control médico.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento - incluso los adquiridos sin receta médica, homeopáticos, plantas medicinales u otros productos relacionados con la salud, ya que puede ser necesario interrumpir el tratamiento o ajustar la dosis de alguno de ellos.

No se conocen interacciones con otros medicamentos. No obstante, evite la aplicación simultánea con otro preparado de uso cutáneo, a fin de evitar posibles interferencias entre principios activos.

Uso de FEPARIL 10mg / 50mg / g gel con los alimentos y bebidas

No se ha descrito ningún efecto entre el uso de este medicamento y la toma de alimentos y bebidas.

Uso en niños

No utilizar en niños menores de 7 años.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

IMPORTANTE PARA LA MUJER: Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Conducción y uso de máquinas

No son de esperar efectos de este medicamento sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinarias.

3. CÓMO USAR FEPARIL 10mg / 50mg / g gel

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

Adultos y niños mayores de 7 años.

Uso exclusivo sobre piel intacta.

Aplique una fina capa de gel una o varias veces al día sobre la zona afectada realizando un pequeño masaje para favorecer la absorción del producto.

No utilice el medicamento sobre grandes extensiones de piel.

Si los síntomas empeoran o si persisten después de 5 días, debe consultar al médico.

Se deben lavar las manos después de cada aplicación a fin de evitar un contacto involuntario con ojos y mucosas.

Si usa más FEPARIL 10mg/50mg/g gel del que debiera

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a un centro médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 62 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó usar FEPARIL 10mg/50mg/g gel

No aplique una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Espere a la siguiente aplicación y prosiga con la pauta habitual.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, FEPARIL 10mg/50mg/g gel puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Durante el periodo de utilización de la combinación de Escina y Salicilato Dietilamina en gel se han observado los siguientes efectos adversos cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud:

En general son leves y poco frecuentes.

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Puede aparecer eritema (enrojecimiento de la piel) en el área de aplicación debido a irritación local o a que se ha producido una dermatitis de contacto. Ambos remiten totalmente al cesar el tratamiento.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE FEPARIL 10mg/50mg/g gel

No se precisan condiciones especiales de conservación.

Mantener FEPARIL 10mg/50mg/g gel fuera del alcance y de la vista de los niños.

Caducidad

No utilice FEPARIL 10mg/50mg/g gel después de la fecha de caducidad (Cad.) que aparece en la caja y en el tubo. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Los principios activos son Escina y Salicilato de dietilamina.
- Los demás componentes son Ácido poliacrílico, caprilocaprato de macrogol-6-glicerol, edetato de disodio, trometamol, alcohol isopropílico, agua purificada, aceite de lavanda, aceite de azahar.

Aspecto del producto y contenido del envase

FEPARIL 10mg/50mg/g gel es un gel transparente, incoloro a amarillo claro, con olor a lavanda, que se presenta en tubos de aluminio, conteniendo un total de 40 ó 100 g de gel.

Titular de la autorización de comercialización

ROTTAPHARM, S.L.
Avda. Diagonal, 67-69
(Barcelona) - 08019 - España

Responsable de la fabricación

MADAUS GMBH
Colonia Alle, 15 (Colonia)
51101 Alemania

Este prospecto ha sido aprobado en enero de 2008

LOGO MADAUS