

**ACTIMAG
PIDOLATO MAGNÉSICO**

**SOLUCIÓN ORAL
IQUINOSA FARMA**

COMPOSICIÓN

	En 1 ml	En 5 ml
Pidolato magnésico	0,4 g	2 g
Excipientes: sacarosa, propilenglicol, sacarina de sodio, parahidroxibenzoato de metilo (E218), aroma de frambuesa, parahidroxibenzoato de propilo (E216), aroma de menta piperita, colorante carmoisina (E122), agua, c.s.		

INDICACIONES

ACTIMAG constituye un tratamiento efectivo del déficit magnésico, en cualquiera de sus formas, ya que la penetración intracelular del catión magnésico bajo forma de pidolato, es prácticamente total y rápida.

CONTRAINDICACIONES

Insuficiencia renal descompensada o aguda. Miastenia gravis. Coma diabético. Enfermedad de Cushing.

PRECAUCIONES

Deberá emplearse con precaución en pacientes con alteraciones del metabolismo del calcio.

ADVERTENCIAS

IMPORTANTE PARA LA MUJER:

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

ADVERTENCIA SOBRE EXCIPIENTES

Este medicamento contiene colorante carmoisina como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.

Este medicamento contiene sacarosa: 0,35 g por 1 ml y 1,75 g por 5 ml, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos.

INCOMPATIBILIDADES

Para evitar un fenómeno de inhibición competitiva no debe administrarse con una terapéutica cálcica concomitante. Puede realizarse, tras unos días de pausa, antes o después.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito en el uso normal a dosis terapéuticas.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

En caso de sobredosificación accidental se recurrirá a lavado gástrico y tratamiento sintomático.

En cualquier caso:

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

POSOLOGÍA

La posología habitual en el **adulto** es de 5 ml dos veces al día.

En el **niño** la dosis media es de 5 ml cada 24 horas.

Estas dosificaciones pueden ser aumentadas en casos de déficit magnésico importante.

PRESENTACIÓN

Envase con 100 ml

Vía oral.

Sin receta médica.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.